

1.3.1	Butamirate
SPC, Labeling and Package Leaflet	SI-Slovenia

## Navodilo za uporabo

### Panatus forte 50 mg filmsko obložene tablete butamiratijev citrat

**Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!**

Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 5 do 7 dneh, se morate posvetovati z zdravnikom.

#### Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Panatus forte in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Panatus forte
3. Kako jemati zdravilo Panatus forte
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Panatus forte
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

#### 1. Kaj je zdravilo Panatus forte in za kaj ga uporabljamo

Panatus forte je zdravilo za simptomatsko zdravljenje kašlja oz. za blaženje dražečega kašlja (antitusik) s centralnim delovanjem.

Preprečuje suh in dražeč kašelj, zmanjšuje napetost bronhialnega mišičja, sočasno pomaga izkašljevati ter olajša dihanje in bolečine v prsih. Vse to ugodno vpliva na izboljšanje dihalne kapacitete in na koncentracije plinov v krvi. Kemično in po svojih učinkih se razlikuje od opiatnih antitusikov in ne povzroča odvisnosti. Zdravilo je primerno tudi za otroke in sladkorne bolnike.

Tablete Panatus forte priporočamo za simptomatsko zdravljenje dražečega suhega kašlja, ki nastane zaradi kateregakoli vzroka.

#### 2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Panatus forte

##### Ne jemljite zdravila Panatus forte

- če ste alergični na butamiratijev citrat ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6).

##### Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom jemanja zdravila Panatus forte se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom:

- če imate hudo ledvično okvaro.

Izogibajte se sočasni uporabi zdravil, ki olajšajo izkašljevanje (ekspektoransov) (glejte poglavje Druga zdravila in Panatus forte).

Če se v času zdravljenja pojavijo težko dihanje, vročina ali gnojni izpljunek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

#### Otroci

1.3.1	Butamirate
SPC, Labeling and Package Leaflet	SI-Slovenia

Panatus forte 50 mg filmsko obloženih tablet ne dajemo otrokom, mlajšim od 12 let.

#### **Druga zdravila in zdravilo Panatus forte**

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo.

Butamirat citrat, zdravilna učinkovina v zdravilu Panatus forte, zavira refleks kašlja. Izogibajte se sočasni uporabi ekspektoransov (zdravil za olajšanje izkašljevanja), saj lahko pride do zastajanja sluzi v dihalnih poteh ter povečanega tveganja za pojav bronhospazma (zožitve bronhijev) in okužbe dihal.

#### **Zdravilo Panatus forte skupaj s hrano, pijačo in alkoholom**

Tablete jemljite (oziroma dajte otroku) pred jedjo ali po jedi.

Med zdravljenjem z zdravilom Panatus forte ne pijte alkoholnih pijač.

#### **Nosečnost in dojenje**

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Čeprav ni podatkov o negativnih učinkih, odsvetujemo jemanje v prvih treh mesecih nosečnosti. V poznejših mesecih nosečnosti ga jemljite le po nasvetu zdravnika.

Prav tako ni ustreznih podatkov o prehajanju zdravila v mleko, zato odsvetujemo jemanje zdravila med dojenjem.

Če ste med zdravljenjem z zdravilom Panatus forte zanosili, se posvetujte z zdravnikom.

#### **Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev**

Zdravilo Panatus lahko povzroči zaspanost in omotico, zato morate biti previdni med vožnjo ter upravljanjem s stroji.

#### **Zdravilo Panatus forte vsebuje laktozo**

Če vam je zdravnik povedal, da ne prenašate nekaterih sladkorjev, se pred uporabo tega zdravila posvetujte s svojim zdravnikom.

### **3. Kako jemati zdravilo Panatus forte**

Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Samozdravljenje z zdravilom Panatus forte je primerno za odrasle in otroke, starejše od 12 let.

Običajni odmerek zdravila Panatus forte za odrasle (tudi starejše) je 1 tableta (50 mg) dvakrat do trikrat na dan.

#### **Uporaba pri otrocih in mladostnikih**

Običajni odmerek zdravila Panatus forte za otroke, starejše od 12 let, je 1 tableta (50 mg) enkrat do dvakrat na dan.

Tablete jemljite pred jedjo ali po jedi. Tableto pogoltnite s tekočino.

Pri samozdravljenju z zdravilom Panatus forte ne smete prekoračiti priporočenega odmerka.

Samozdravljenje lahko traja 5 do 7 dni. Če kljub jemanju zdravila simptomi trajajo dlje ali se poslabšajo v času zdravljenja, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

#### **Če ste vzeli večji odmerek zdravila Panatus forte, kot bi smeli**

Če ste vzeli (ali dali otroku) večji odmerek zdravila, kot bi smeli, se takoj posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Zdravilo poskusite izbruhati.

1.3.1	Butamirate
SPC, Labeling and Package Leaflet	SI-Slovenia

Preveliki odmerki zdravila Panatus forte lahko povzročijo zaspanost, bruhanje, neusklajenost gibov (ataksija), bolečine v trebuhu, drisko, razburjenost in nekoliko zmanjšan krvni tlak.

#### **Če ste pozabili vzeti zdravilo Panatus forte**

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnjo tableto.

Zdravilo jemljite (oziroma dajte otroku) vsak dan ob približno istem času. Če ste pozabili vzeti tableto, jo vzemite čimprej, toda če manjka do naslednje tablete samo nekaj ur, raje počakajte in naslednjo tableto zdravila vzemite ob običajnem času, pozabljeno pa izpustite.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

#### **4. Možni neželeni učinki**

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

*Redki neželeni učinki (pojavi se lahko pri največ 1 od 1.000 bolnikov):*

- kožni izpuščaji, urtikarija (koprivnica),
- prebavne motnje (slabost, bruhanje, driska),
- omotica, zaspanost.

Tudi pri dolgotrajnem jemanju niso ugotovili neželenih učinkov na življenjske funkcije in delovanje drugih organov. Posebna prednost zdravila je, da niso opazili neželenih učinkov, ki so značilni za opiatne antitusike.

#### **Poročanje o neželenih učinkih**

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco

Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva ulica 22

SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)8 2000 500

Faks: +386 (0)8 2000 510

e-pošta: [h-farmakovigilanca@jazmp.si](mailto:h-farmakovigilanca@jazmp.si)

spletna stran: [www.jazmp.si](http://www.jazmp.si)

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

#### **5. Shranjevanje zdravila Panatus forte**

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo in vlago.

1.3.1	Butamirate
SPC, Labeling and Package Leaflet	SI-Slovenia

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

## 6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

### Kaj vsebuje zdravilo Panatus forte

- Učinkovina je butamiratijev citrat. Ena filmsko obložena tableta vsebuje 50 mg butamiratijevega citrata
- Druge sestavine zdravila so laktoza monohidrat, povidon, hipromeloza (E464), smukec, magnezijev stearat (E470b) in brezvodni koloidni silicijev dioksid v jedru tablete ter hipromeloza (E464), titanov dioksid (E171), rdeči železov oksid (E172), smukec in propilenglikol (E1520) v filmski oblogi. Glejte poglavje 2 "Zdravilo Panatus forte vsebuje laktozo".

### Izgled zdravila Panatus forte in vsebina pakiranja

Filmsko obložene tablete so okrogle, rahlo izbočene, prevlečene z rdeče-rjavim filmom.

Na voljo so škatle z 10 filmsko obloženimi tabletami v pretisnem omotu.

### Način in režim izdaje zdravila Panatus forte

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.

### Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in proizvajalec

KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 10. 2. 2022.