

NAVODILA O UPORABI IZDELKA ENTEROZOO[®]

Dietetični veterinarski izdelek

Odobreno s USKVBL homologacijo 080/10/C.

Shranjevanje: Hranite pri temperaturi nad 4°C, nedosegljivo otrokom. Po odprtju tubo ali lonček dobro zaprite, da s tem preprečite izsušitev. **Ne zmrzujte!**

KORISTNE INFORMACIJE O UČINKU IN DELOVANJU EnteroZOO[®]

Prebavni trakt igra pomembno vlogo pri ohranjanju zdravja zaradi naslednjih razlogov:

- telesu dovaja vse potrebne hranilne snovi in vodo;
- je ena izmed poti, preko katere se iz organizma odvajajo izločki in strupi;
- ima najpomembnejši vpliv na imunski sistem in deluje kot varnostna pregrada.

Povzročitelji okvare zdravja in bolezenski simptomi:

Intenzivni vdor povzročiteljev infekcijskih bolezni, strupov, alergenov in ksenobiotikov (pesticidi, radionuklidi, soli težkih kovin) v prebavni trakt vodi do razvoja želodčnih in prebavnih infekcij, zastrupitev ter alergijskih reakcij.

Med delovanjem telesa se v organizmu tvorijo škodljivi in strupeni presnovki. Nekateri izmed njih vstopijo v črevesje in se po naravni poti skupaj z blatom odstranijo iz telesa, določene škodljive snovi pa se lahko ponovno absorbirajo v krvni obtok ter preko jeter zapadejo v enterohepatično kroženje.

Najpogostejši simptomi akutne zastrupitve so bruhanje, driska, krči in povišana telesna temperatura.

Dolgoročni vpliv manjših koncentracij endogenih in eksogenih strupov vodi do kronične intoksikacije in je posledično vzrok za nastanek drugih bolezni ter alergij pri živalih.

Pomemben korak do okrevanja, optimalnega zdravja in dolge življenske dobe pri živalih je odstranitev strupov in mikroorganizmov, ki povzročajo bolezni, iz prebavnega trakta.

EnteroZOO® učinkovito odstrani strupene snovi iz organizma in izboljša zdravje in dobro počutje.

Aktivna učinkovina v izdelku EnteroZOO® je polimer na osnovi organskega silicija: polimetilsiloksan polihidrat (hidrogel metilsilicijeve kisline), ki ima porozno in želatinasto strukturo.

EnteroZOO® je sposoben selektivne adsorpcije, katera je omogočena zaradi velikosti njegovih por. Te pore omogočajo izdelku EnteroZOO® selektivno vezavo škodljivih snovi na svojo površino, hranljivih in telesu koristnih snovi pa ne veže. Selektivno razstrupljanje pripelje do bistvenega izboljšanja splošnega zdravja, urejene prebave, povišanja odpornosti proti infekcijskim okužbam ter s tem pomaga organizmu živali, da deluje optimalno.

EnteroZOO® veže nase patogene bakterije, viruse, toksine, težke kovine, alergene in strupene snovi. Posledica tega je, da vzpostavi pogoje za rast normalne mikroflore in obnovi naravno odpornost organizma.

EnteroZOO® ne veže vitaminov, mineralov, mikroelementov, makroelementov in drugih hranilnih snovi ter se ga lahko daje živali tudi daljše obdobje. Nase ne veže vode, zato ne povzroča zaprtja.

EnteroZOO® zaščiti sluznico želodca in črevesja, saj nad njo naredi zaščitno plast in spodbuja njeno obnovo.

EnteroZOO® je popolnoma varen izdelek in se ga zato lahko daje tudi mladičem in brejim živalim.

Prosimo vas, da pazljivo preberete informacije in si shranite navodila o uporabi, saj vsebujejo koristne informacije o izdelku EnteroZOO®, katere je potrebno upoštevati. Morda jih boste kasneje ponovno potrebovali. V primeru dodatnih vprašanj pokličite: 05/909 80 48 ali pa se posvetujte z veterinarjem.

1. Kaj je EnteroZOO® in za kaj se ga uporablja?

EnteroZOO® je inovativni prebavni adsorbent (enterosorbent) nove generacije zasnovan na naravnem siliciju. Nase veže toksine, škodljive snovi, patogene in alergene v prebavnem traktu ter jih izloči iz telesa.

Glavni učinki EnteroZOO®:

- Izboljšuje splošno odpornost in stanje živali.
- Blaži potek drisk (tudi infekcijskih) in zastrupitev, pomaga ustaviti drisko in skrajša trajanje le te.
- Odpravlja simptome prebavnih motenj.
- Pomaga uravnati ravnovesje črevesne mikroflore, katera podpira delovanje imunskega sistema telesa.
- Ščiti sluznico prebavil in pripomore k hitrejšemu celjenju poškodb in razjed (ulkusev) na sluznici.
- Blaži in preprečuje toksične in alergijske reakcije.
- Veže toksine.
- Pospešuje celjenje ran.
- Zmanjša toksično obremenitev jeter in ledvic.

EnteroZOO® se uporablja pri živalih ob sledečih bolezenskih stanjih:

- Akutne driske, katerim vzrok so bakterije, virusi (vključno z rotavirusi), zastrupitev s hrano ali ob jemanju antibiotikov;
- kronične driske zaradi različnih vzrokov;
- težave s prebavo;

- motnje v črevesni mikroflori (npr. ob jemanju antibiotika);
- ulkusi oz. poškodbe sluznice prebavil;
- zastrupitve;
- kroničnem popuščanju jeter in ledvic;
- alergijske bolezni;
- bolezni kože in rane.

EnteroZOO® lahko uživajo tudi zdrave živali za krepitev imunskega sistema, saj EnteroZOO® pripomore k večji odpornosti telesa in boljšemu zdravju živali.

EnteroZOO® se ne absorbira v kri in se izloči z blatom v 7.-12. urah po aplikaciji/dajanju.

2. Kako jemati EnteroZOO®?

Priporočljivo je, da se EnteroZOO® zaužije ob prvih znakih bolezni ali zastrupitvi. V primeru atopij je priporočljivo, da živali EnteroZOO® pričnemo dajati že pred pojavom alergena v okolju. EnteroZOO® je brez okusa in vonja, tako da ga žival rada zaužije. EnteroZOO® lahko apliciramo na različne načine; direktno v usta (s plastično brizgo), vmešamo v hrano, krmilo, posladek, pitno vodo ali vmešano v pitno vodo in dozirano s krmno črpalko, itd.

Enostavno odmerjanje glede na vrsto in težo živali:

Splošno doziranje: 1 čajna žlička = 5 g = ½ vrečke = 5 ml, 1 zvrhana čajna žlička = 10 g = 1 vrečka = 10 ml, 1 jušna žlica = 15 g = 1 ½ vrečke = 15 ml. EnteroZOO® se ne absorbira in je popolnoma varen tudi ob nenamernem zaužitju prevelikega odmerka.

- **Psi in mladiči:** do 4 kg – 2,5 ml 1-3x dnevno; 4-15 kg – 5ml 1-3x dnevno; 15-30 kg – 10 ml 1-3x dnevno; nad 30 kg - 15 ml 1-3x dnevno. Dozirajte direktno

v ustno votlino (s pomočjo plastične brizge), zmešajte s hrano, priboljškom ali pitno vodo.

- **Mačke in mladiči:** do 2 kg – 2,5 ml 1-3x dnevno; nad 2 kg – 5 ml 1-3x dnevno. Dozirajte direktno v ustno votlino (s pomočjo plastične brizge), ali zmešajte v hrano.
- **Kunci, morski prašički, podgane, dihurji:** 2 ml 1-3x dnevno; dozirajte direktno v ustno votlino (s pomočjo plastične brizge) ali vmešajte v manjšo količino pitne vode.
- **Hrčki, miške:** 1ml 1-3x dnevno; dozirajte direktno v ustno votlino (s pomočjo plastične brizge) ali vmešajte v manjšo količino pitne vode.
- **Ptice in okrasna perutnina:** 1ml 1-3x dnevno; dozirajte direktno v ustno votlino (s pomočjo plastične brizge) ali vmešajte v manjšo količino pitne vode (vsak dan pripravite novo mešanico).
- **Perutnina:** 10 ml 2x dnevno, vmešajte v 1 l vode za pitje.
- **Domače živali: Prašiči in prašički, živina in teleta, koze in kozlički, ovce in jagnjeta, konji in žrebeta:** 5 ml na 10 kg telesne teže 1-3x dnevno, dozirajte direktno v ustno votlino (s pomočjo plastične brizge).

Akutna driska

Prvo doziranje – začnite z dvojnimi odmerki, kateremu naj sledi enkratni odmerek ob vsakem odvajanju. Ko se driska ustavi, je priporočljivo dajati EnteroZOO® še 3 dni po standardnih navodilih glede na težo.

Želodčne in črevesne razjede (ulkusi)

Eno standardno doziranje vsaj 3x dnevno v obdobju 10-14 dni.

Hude zastrupitve ali intoksikacije

Prvo doziranje – dve standardni doziranji, nato po eno standardno doziranje vsako uro, skupaj 24 ur.

Kožne težave

Eno standardno doziranje 3x dnevno v obdobju 1 meseca ali dlje. V primeru atopij je priporočljivo, da se izdelek prične dajati 14. dni pred pojavom alergena v okolju.

Kožni nanos

EnteroZOO® se lahko uporablja tudi na prizadetih predelih kože v primeru okužb, ekcemov, alergijskih kožnih reakcij, poškodb kože, ipd. Nanesite debelo plast gela na prizadeto območje. Ko se posuši, se gel sam odlušči. Preprečite, da žival prizadeta mesta liže. Priporočamo kombiniranje uporabe: peroralno (v ustno votlino) in zunanjo (nanos na kožo). Ker EnteroZOO® ne vsebuje alkohola, nanos na rano ni pekoč.

Profilaktično razstrupljanje

1 standardno doziranje 3x dnevno, v obdobju 10-14 dni.

EnteroZOO® aplicirajte 1-2 uri pred ali po dajanju drugih zdravil (na ta način ni mogoče, da bi EnteroZOO® nase vezal katero izmed zdravilnih učinkovin).

Priporočljivo trajanje jemanja

V primeru akutne zastrupitve priporočamo uživanje izdelka EnteroZOO® 3-5 dni.

V primeru neprekinjene izpostavljenosti strupenim snovem ali alergenom je priporočljivo jemanje izdelka ves čas izpostavljenosti in še 2-3 tedne po tem.

3. Kaj se zgodi, če živali pozabimo dati EnteroZOO®?

Nevarnosti ni nobene. Nadaljujte z normalno uporabo izdelka EnteroZOO®.

4. Kakšni so možni stranski učinki ob jemanju EnteroZOO®?

V zelo redkih primerih se lahko pojavi zaprtost.

5. Uporaba izdelka EnteroZOO® pri brejih živalih.

EnteroZOO® se lahko brez nevarnosti uporablja med brejestjo in dojenjem.

6. Kaj se zgodi, če žival pomotoma zaužije večji odmerek izdelka EnteroZOO®?

Do sedaj ni bil zabeležen noben primer. Živali in njihovi mladiči EnteroZOO® v večjih dozah dobro prenašajo. Redko se lahko pojavi zaprtje.

7. Dodatne informacije

Sestava: Polimetilsiloksan polihidrat – 60 %, prečiščena voda – 40 %.

EnteroZOO[®] ne vsebuje sladkorja, sladil, laktoze, glutena, maščob, barvil, okusa, konzervansov, niti sestavin rastlinskega ali živalskega vzroka.

Pakiranje: Peroralna suspenzija; Tuba 100 g; Paket vrečk 15x10 g; Lonček 450 g; Tuba 'trojček' (3x100 g); Paket vrečk 'trojček' (3x 15x10 g).

Opozorilo: Pred odprtjem tube, vrečko ali lonček dobro pretresite. Ob stiskanju gela EnteroZOO[®] iz tube ali vrečke, se lahko pojavi malo tekočine.

Generalni uvoznik za Slovenijo:

Pharmazine d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6

1000 Ljubljana, Slovenija

Informacije in trgovina: www.enterozoo.si

FB: EnteroZOO Slovenija

IG: enterozooslovenija