



REF SLO

Ne uporabljajte po preteklu roka uporabe odtisnjenega na zaščitni foliji.

Test shranjujte v suhem prostoru, pri temperaturi 4° - 30°C.

Test je namenjen za domačo uporabo. Samo za zunanjou uporabo.

POVZETEK IN DELOVANJE

Človeški horionski gonadotropin (hCG) je glikoproteinski hormon, ki ga izloča placenta kmalu po oploditvi. FIRST SIGN™ je urinski test, ki zazna nizke koncentracije hormona hCG (>25mIU/ml) v urinu noseče ženske nekaj dni po oploditvi (še pred izostankom menstruacije). Rezultat se lahko pokaže v manj kot 5. minutah.

UPORABA

1. Testno palčico odstranite iz zaščitne folije.
2. Odstranite pokrovček in ga namestite na držalo, da s tem podaljšate velikost testne palčice in tako omogočite bolj higienično uporabo.
3. Testno palčico primite za držalo, absorpcijsko konico izpostavite direktno toku vašega urina za vsaj 15 sekund, da se testna konica popolnoma namoči (glej sliko). Pomembno: ne urinirajte na plastični del testne palčice. Če želite, lahko urinirate v čisto in suho posodo in ter vanjo pomočite absorpcijsko konico za vsaj 15 sekund.
4. Ko umaknete testno palčico iz urina, pokrijte absorpcijsko konico s pokrovčkom. Test položite na ravno podlago tako, da sta testno in kontrolno okence obrnjena navzgor, ter začnite meriti čas.
5. Ozadje testnega in kontrolnega okanca se sprva obarva rahlo roza. Rezultat odčitajte po 5. minutah.

NE ODČITAVAJTE REZULTATA PO 10. MINUTAH.

ODČITAVANJE TESTA

NOSEČNOST

Če se pojavit dve roza-vijolični črtici, ena v testnem okenčku (T), druga pa v kontrolnem okenčku (C), pomeni, da ste najverjetnejše noseči. Ena črtica je lahko manj izrazita.



NEVELJAVEN REZULTAT

Test je neveljaven, če se v kontrolnem okenčku (C) ne pojavi roza-vijolična črtica, četudi se črtica pojavi v testnem okenčku (T). V tem primeru morate testiranje ponoviti z novim testom.



OMEJITVE

1. Uživanje alkohola ima lahko vpliv na rezultate testiranja. Ne priporočamo uporabo testa po uživanju alkohola.
2. Testiranje urinskih vzorcev ženske, ki je resnično šele na začetku nosečnosti in vsebuje zelo nizke koncentracije hCG-ja, lahko pokaže negativen rezultat. V tem primeru priporočamo ponovno testiranje po 48. urah.
3. V primerih, ko so v testiranem urinu prisotne izredno visoke koncentracije hCG-ja (>300IU/ml), lahko pride do t.i. Prozonovega efekta. V primeru suma nosečnosti je potrebno urin pred testiranjem razredčiti z vodo 1:1 in ponovno izvesti testiranje.
4. Skladno z drugimi diagnostičnimi postopki je potrebno rezultate testiranj evaluirati v luči ostalih kliničnih informacij in se pred nadaljnji medicinskim odločitvami posvetovati z zdravnikom za postavitev dokončne diagnoze nosečnosti.

Datum zadnje revizije: 10.11.2017

	Ni za ponovno uporabo		Samo za „in vitro“ diagnostično uporabo
	Shranjujte med 4° in 30°C		Opozorilo: glejte navodilo za uporabo
	Proizvajalec		Avtoriziran predstavnik v EU
	Serijska številka		Uporabno do
	Število testov v pakiranju		Kataloška številka

W.H.P.M. Bioresearch & Technology Co., Ltd
No.2 Zhongxin Street, LouZiZhuang, Jinzhanshian,
Chaoyang District, Beijing, 100018, P.R. China

Medical Device Safety Service GmbH
Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany

Zastopnik za Slovenijo in Hrvaško:
Sigeo d.o.o., Celovška 172, 1000 Ljubljana, Slovenija