



AFTE RAPID⁺

USTNE RAZJEDE (AFTE)

SL) Razširjen problem, ki zahteva učinkovito rešitev.

Aftone razjede so najpogostejša vrsta lezij na ustni sluznici. Vzroki zanje niso popolnoma znani, čeprav so z njihovim nastankom povezani dejavniki, kot so stres, telesna in duševna utrujenost, nekatere bolezni, poškodbe in rane, hormonske spremembe, alergije in pomanjkanje vitaminov.

Razjede v ustih se pogosto začnejo s pekočim občutkom na enem mestu, čemur sledi razvoj majhne, okrogle, rumenkastе bele rane (razjede) z vnetimi robovi in premerom približno 3-4 mm, včasih lahko tudi več kot 1 cm.

Niso nevarne za zdravje in niso nalezljive. Pogosto pa povzročajo bolečino, ki je v nekaterih primerih lahko celo intenzivna. Odvisno od velikosti aft in prizadetega območja se v enem ali največ štirih tednih spontano zacelijo.

Pospesevanje zdravljenja in zmanjšanje zaznane bolečine je lahko pomembna korist za ljudi, ki trijpo zaradi aftnih razjedov.

ULKUSI U USNOJ ŠUPLJINI (AFTE)

HR) Učestali problem koji zahtijeva djełotvorno rešenje.

Afte su jedna od najčešćih bolesti usne sluznice. Uzroci nastanka lezija nisu u potpunosti razjašnjeni. Čimbenici koji su povezani s njihovom pojmom su: stres, tjelesna i mentalna iscrpljenost, određene bolesti, ozljede i rane, hormonalne promjene, alergije i nedostatak vitalnih tvari.


Ulkusi u usnoj šupljini uobičajeno započinju s osjećajem žarenja na određenom mjestu, na-

kon čega se razviju male lezije okruglog oblika (ulkusi), prekrivene bjelkastim membranama i eritematoznim rubovima promjera 3-4 mm koji može ponekad biti veći i od 1 cm.

Afte nisu opasne za zdravje i nisu zarazne. Međutim, često uzrokuju bol koja može u nekim slučajevima biti vrlo jaka. Ovisno o njihovoj veličini i zahvaćenom području, spontano zarastaju u razdoblju od 1 do 4 tjedana.

Ubrzavanje procesa zaceljivanja i smanjenje боли je od velike koristi za ljudje koji pate od ulkusa u usnoj šupljini.

TRI VRSTE AFTOZNEGA STOMATITISA TRI VRSTE AFTOZNOGA STOMATITISA



CURASEPT AFTERAPID⁺

SL) INDIKACIJE:

- razjede v ustih, aftozni stomatit, razširjene razjede v ustih
- poškodbe zaradi ortodontskih aparativ, fiksnih in odstranljivih protet, kirurški posegi
- virusne (virus herpesa), glivične (ustni sor) in bakterijske okužbe

HR) INDIKACIJE:

- Ulkusi u usnoj šupljini, aftozni stomatit, rašireni ulkusi u usnoj šupljini;
- Ozljede zbog protetiskih, ortodontskih aparata i kirurških zahvata;
- Virusne infekcije (virus herpesa), glivične i bakterijske infekcije u ustima;

SL) AKTIVNE UČINKOVINE:

Mukoadhezivni polimeri: zaščitijo prizadeto območje pred bakterijami, zmanjšujejo bolečino in trenje ter spodbujajo fiziološke procese celjenja in ponovno epitelizacijo tkiva.

DNA/RNA: spodbuja obnovu in rast epitelijalnih celic.

HIALURONSKA KISELINA: deluje protutopalno in zmanjšuje bolečino in pospeševanje celjenja tkiv.

HR) AKTIVNI SASTOJCI:

Mukoadhezivni polimeri: štite zahvačeno područje od bakterija, zmanjšuju bol i trenje te potiču fiziološke procese celjenja i ponovnu epitelizacijo tkiva.

DNA/RNA fragmenti: jačaju obnovu i rast epitelijalnih stanica.

HIALURONSKA KISELINA: deluje protutopalno i smanjuje bol poticanjem zaceljivanja tkiva.

SL) CURASEPT AFTERAPID⁺

Popolna linija medicinskih pripomočkov za učinkovito blaženje težav na razjedih v ustih in aftoznegu stomatitisu.

SL) CURASEPT AFTERAPID⁺

Kompletna linija medicinskih proizvoda za ublaževanje problema s ulkusima u usnoj šupljini i aftoznom stomatitisu.

SL) CURASEPT AFTERAPID⁺

Formulacija z DNA/RNA in hialuronsko kiselinom ustvari zaščitno pregrado na razjedi ter s tem hitro lajša bolečino. Poleg tega skrajša čas celjenja, izboljša tropizem celic in pomaga pri regeneraciji ustne sluznice.

HR) CURASEPT AFTERAPID⁺

Zahvaljujući formulaciji s DNA/RNA fragmentima in hialuronskom kiselino brzo ublažava bol stvarajučem zaščitnem sloju površe lezija. Skraćuje vrijeme zaceljivanja, poboljšava tropizmom stanica i pomaze u regeneraciji usne sluznice.



ZAŠČITNI GEL / ZAŠTITNI GEL*

SL) Ščiti pred akutno bolečino, ki jo povzročajo razjede v ustih in poškodbe ustne sluznice. Idealno za lokalno delovanje pri enojnih ali manjših ustnih razjedih.

Pomaga izolirati in zaščititi območje razjeda v ustni votlini z zmanjšanjem občutljivosti za dražilne snovi. Lajša boleče simptome, hrkati pa skrajša čas celjenja. Obnavlja hidrolipidni film, izboljšuje tropizem celic in spodbuja regeneracijo celic.

HR) Ščiti od akutne boli uzrokovane ulkusima i oštećenjima usne sluznice. Idealno za lokalno djełovanje kod pojedinačnih ili malih orálnih lezija.

Pomaga izolirati i zaščiti područja ulkusa u usnoj šupljini smanjenjem osjetljivosti na nadražjujuće tvari. Ublažava bolne simptome istovremeno

smanjujući vrijeme zaceljivanja. Obnavlja hidrolipidni sloj, poboljšava tropizmom stanica i potiče regeneraciju stanica.

SL) INDIKACIJE

Posamezne razjede v ustih, aftozni stomatit, lezije zaradi poškodb ali pomanjkanja vitamina, herpes labialis, stomatit, povzročen s kemoterapijo ali radioterapijo.

HR) INDIKACIJE:

Lokalizirani ulkusi u usnoj šupljini, aftozni stomatit, lezije zbog ozljede ili nedostatka vitamina, herpes labialis, stomatit, izazvan kemo-terapijom ili radioterapijom.

SL) NAVODILA ZA UPORABO

En teden nanašajte majhno količino gela dva ali trikrat na dan neposredno na prizadeto območje v ustih. Uporabite priložen nastavek za nanašanje, lahko pa si pomagate s čistimi in suhih prst ali vatrirano palčko. Ne ispirajte ust vsaj eno uro po nanosu. Dobro poskrbite za vsakodnevno ustno higieno.

HR) UPUTE ZA KORIŠTENJE:

Nanjite malu količino gela 2 do 3 puti dnevno tijekom jednog tjedna izravno na zahvačeno područje u ustima. Upotrijebiti priloženi nastavak, čiste i suhe prste ili pamučne štapice. Ne ispirajte usta najmanje jedan sat nakon nanosa. Svakodnevno održavati oralnu higijenu.

SL) SESTAVINE: Glej INGREDIENTS.

HR) SASTAV: Pogledati INGREDIENTS.

INGREDIENTS:

PURIFIED WATER, PROPYLENE GLYCOL, VP/VA COPOLYMER, CARBOMER, CELLULOSE GUM, CALCIUM/SODIUM PVM/MA COPOLYMER, HYDROLYZED RNA/DNA, LEUCONOSTOC/RADISHROOTFERMENTFILTRATE, HYALURONIC ACID, ALLANTOIN, GLYCYRRHETINIC ACID, BETA-GLUCAN, GLYCERIN, RUSCOGENIN, BISABOLOL, LEPTOSPERMUM SCOPARIUM BRANCH/LEAF OIL, MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL, O-CYMEN-5-OL, PHENOXYETHANOL, SODIUM BENZOATE, AMMONIUM GLYCRRHIZATE, SODIUM SACCHARIN, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, CAPRYLYL GLYCOL, 1,2-HEXANEDIOL, AROMA, C.I. 42090.

SL) OPORIZILA:

Samo za zunanjou uporabo. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Hranite ločeno od virov toplove. Ne pogolnите. Uporaba do 6. leta starosti ob pomoći staršev ali skrbnikov.

HR) UPOZORENJA:

Samo za vanjsku uporabu. Čuvati izvan dohvata djece. Držati dalje od izvora topline. Ne gutati. Korištenje do 6 godine starosti uz pomoći roditelja ili skrbnika.



USTNA VODA*/ TEKUĆINA ZA ISPIRANJE USNE ŠUPLJINE*

SL) Lajša bolečine, ki jih povzročajo razjede v ustih in aftozni stomatitis. Idealno za razsirjeno delovanje ob več poškodbah ustne sluznice in ponavljajočih se razjedah v ustih. Deluje v sinergiji z drugimi načini zdravljenja v liniji izdelkov za učinkovito lajšanje bolečin. Pomaga pri regeneraciji dlesni, saj povečuje vlaženje sluznice, kar tudi izboljša tropizem celic in regeneracijo.

HR) Ublažava bol uzrokovani ulkusima u usnoj šupljini i afotnim stomatitisom. Idealna za produženo delovanje u prisutnosti višestrukih ozjeda usne sluznice i ponavljajućih lezija. Dje luje u sinergiji s drugim proizvodima iz linije kako bi učinkovito ublažila bol. Pomaže u regeneraciji zubnog mesa jer povećava hidrataciju sluznice što rezultira poboljšanim staničnim tropizmom i obnovom stanica.

SL) INDIKACIJE

Razjede v ustih, virusne (virus herpesa), glivične (ustni sor) in bakterijske okužbe.

HR) INDIKACIJE:

Ulkusi u usnoj šupljini, afotni stomatitis, virusne infekcije (virus herpesa), glivične i bakterijske infekcije u ustima.

SL) NAVODILA ZA UPORABO

Pred uporabo pretresite. Teden dni uporabljajte približno 10 ml dvakrat na dan. Izpirajte vsaj eno minutno. Ne jeite in ne pijte vsaj eno uro po izpiranju. Dobro poskrbite za vsakodnevno ustno higieno.

HR) UPUTE ZA KORIŠTENJE:

Protrosti prije upotrebe. Upotrijebiti otprilike 10 ml tekućine dva puta dnevno kroz tjedan dana. Izpirati najmanje jednu minutu. Ne jesti ni pitи

najmanje jedan sat nakon ispiranja. Svakodnevno održavati oralnu higijenu.

SL) SESTAVINE: Glej INGREDIENTS.

HR) SASTAV: Pogledati INGREDIENTS.

INGREDIENTS:

PURIFIED WATER, DICAPRYLYL ETHER, COCO-CAPRYLATE/CAPRATE, CETEARETH-20, XYLITOL, GLYCERYL STEARATE, PROPYLENE GLYCOL, HYDROLYZED RNA/DNA, LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE, HYALURONIC ACID, ALLANTOIN, GLYCYRRHETINIC ACID, CETYL PALMITATE, CETEARYL ALCOHOL, CETEARETH-12, BETA-GLUCAN, GLYCERIN, RUSCOGENIN, BISABOLOL, LEPTOSPERMUM SCOPARIUM BRANCH/LEAF OIL, MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL, O-CYMEN-5-OL, SODIUM BENZOATE, PHENOXYETHANOL, SODIUM SACCHARIN, AROMA, CAPRYLYL GLYCOL, 1,2-HEXANEDIOL, CITRIC ACID, C.I.16255.



PRŠILO*/ SPREJ*

SL) Lajša bolečine, ki jo povzročajo razjede v ustih in aftozni stomatitis. Idealno za našanje na težko dostopne predele.

Sestavljen je iz stabilne emulzije, ki na leziji tvori zaščitni lipidni film. Lajša bolečine, ki jih povzročajo razjede v ustih, virusne (virus herpesa), glivične (ustni sor) in bakterijske okužbe ter kronicne in imunske bolezni. Pomaga pri regeneraciji dlesni, in sicer s povečanjem vlaženja sluznice, kar izboljša tropizem celic in regeneracijo.

HR) Ublažava bol uzrokovani ulkusima u usnoj šupljini i afotnim stomatitisom. Idealan za ciljanu primjenu na teško dostupnim područjima. Sastoji se od stabilne emulzije koja stvara zaštitni lipidni sloj na leziji. Ublažava bol uzrokovani ulkusima u usnoj šupljini, virus-

nom infekcijom (virus herpesa), glivičnom i bakterijskom infekcijom, kronicnim i imunološkim posredovanim bolestima. Pomaže u regeneraciji zubnog mesa jer povećava hidrataciju sluznice što rezultira poboljšanim staničnim tropizmom stanica i obnovom stanica.

SL) INDIKACIJE

Razjede v ustih, virusne (virus herpesa), glivične (ustni sor) in bakterijske okužbe.

HR) INDIKACIJE:

Ulkusi u usnoj šupljini, afotni stomatitis, virusne infekcije (virus herpesa), glivične i bakterijske infekcije u ustima.

SL) NAVODILA ZA UPORABO

En teden nanašajte z dvema ali tremi potiski pršila vsak dan neposredno na prizadeto območje v ustih. Ne izpirajte ust vsaj eno uro po nanosu. Dobro poskrbite za vsakodnevno ustno higieno.

HR) UPUTE ZA KORIŠTENJE:

Primijenite 2 do 3 pritiska spreja svaki dan tijekom jednog tjedna izravno na zahvaćeno područje u ustima. Ne izpirati usta najmanje jedan sat nakon nanosa. Svakodnevno održavati oralnu higijenu.

SL) SESTAVINE: Glej INGREDIENTS.

HR) SASTAV: Pogledati INGREDIENTS.

INGREDIENTS:

PURIFIED WATER, DICAPRYLYL ETHER, COCO-CAPRYLATE/CAPRATE, CETEARETH-20, XYLITOL, GLYCERYL STEARATE, PROPYLENE GLYCOL, HYDROLYZED RNA/DNA, LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE, HYALURONIC ACID, ALLANTOIN, GLYCYRRHETINIC ACID, CETYL PALMITATE, CETEARYL ALCOHOL, CETEARETH-12, BETA-GLUCAN, GLYCERIN, RUSCOGENIN, BISABOLOL, LEPTOSPERMUM SCOPARIUM BRANCH/LEAF OIL, MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL, O-CYMEN-5-OL, SODIUM BENZOATE, PHENOXYETHANOL, SODIUM SACCHARIN, AROMA, CAPRYLYL GLYCOL, 1,2-HEXANEDIOL, CITRIC ACID.

SL) OPOZORILA:

Samo za zunanjo uporabo. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Hranite ločeno od virov toploče. Ne pogolnjite. Uporaba do 6. leta starosti ob pomoći staršev ali skrbnikov.

HR) UPOZORENJA:

Samo za vanjsku uporabu. Čuvati izvan dohvata djece. Držati dalje od izvora topline. Ne gutati. Koristenje do 6 godine starosti uz pomoć roditelja ili skrbnika.

Slovenski prevod:

VIMT Pharma, d.o.o., Tržaška cesta 495, 1351 Brezovica pri Ljubljani, Zadnjna revizija besedila: 2.11.2022

Hrvatski prijevod:

VIMT Pharma, d.o.o., Savska cesta 41, 10000 Zagreb, Zadnjna revizija teksta: 2.11.2022



AFTE RAPID⁺



*Medicinski priporoček CE, natančno preberite opozorila in navodila za uporabo.

*Medicinski proizvod CE, Prije upotrebe pažljivo pročitajte upozorenja i upute za uporabu.

CURASEPT S.p.A.

Via G. Parini, 19
21047 Sarrono (VA) Italy

SL-distributer: Vivit Pharma d.o.o.,
Tržaška cesta 495, 1351 Brezovica

HR-distributer: Vivit Pharma d.o.o.,
Savska cesta 41, 10000 Zagreb

info@vivitpharma.com