

HEMOpran®

Zaščitna endorektalna krema se priporoča kot pomožno sredstvo pri zdravljenju hemoroidov (notranji in zunanji hemoroidi) ter pri draženju analne in perianalne kože in sluznice. Zahvaljujoč oblikovanju zaščitnega in mazalnega filma preprečuje pogosta draženja zaradi trenja v prisotnosti hemoroidov. Zaprtje, sedeči način življenja, ortostatizem in nosečnost pogosto povzročijo nastanek hemoroidov, HEMOpran krema lajša bolečine, pekoč občutek in srbenje. Formulirano z naravnimi izvlečki s pomirjujočim in osvežujočim delovanjem. Brez derivatov kortizona, barvil in dišav.

Navodila za uporabo in doziranje

Pred uporabo Hemopran zaščitne endorektalne kreme: previdno očistite analno in perianalno področje s sredstvi za umivanje tega področja in jih ustrezno osušite. Za nanašanje zaščitne endorektalne kreme Hemopran: odstranite pokrovček tube, odstranite aluminijasto tesnilo, nato pritrdite kanilo na tubo. Nežno vstavite kanilo v anus in rahlo pritisnite tubo, da vnesete želeno količino kreme. Po uporabi zaščitne endorektalne kreme Hemopran: odstranite kanilo in jo operite z milom in vodo. Zaprite tubo s pokrovčkom. Kanila je za večkratno uporabo. Ponovite zdravljenje do 3-4 krat dnevno, dokler simptomi ne izginejo. Če simptomi ne prenehajo, se posvetujte z zdravnikom. Trajanje zdravljenja ne sme presegati 30 dni. Da bi preprečili draženje pri odvajanju blata, je priporočljivo, da tudi pred iztrebljanjem uporabite zaščitno endorektalno kremo Hemopran.

Sestava: Hemopran zaščitna endorektalna krema je formulirana z glikolnimi ekstrakti divjega kostanja, nepozebnika in bodeče lobodike, z gelom aloe vere, avenantramidom biotehnološkega izvora ter z jojoba oljem. Poleg tega vsebuje še: cetearat-20, cetil estri, fenoksietanol, izopropil miristat, stearinska kislina, C12-20 kisli PEG-8 ester, mentil laktat, karbomer, gliceril stearat SE, trietanolamin, voda.

Opozorila: po uporabi izdelka tubo ustrezno zaprite s pokrovčkom. Po vsaki uporabi kanilo operite. Hraniti izven dosega otrok. Ne uporabljajte na poškodovani koži in sluznicah. Ne pogoltnite. Ne uporabljajte v primeru preobčutljivosti ali alergije na eno od sestavin. Ne uporabljajte po datumu preteka roka uporabnosti, ki je naveden na dnu ovojnine in na tubi. Izdelka ne uporabljajte, če je embalaža odprta in/ali poškodovana. Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri temperaturi med 4 ° C in 35 ° C.

Kontraindikacije in stranski učinki:

Pri normalni in razumno predvidljivi uporabi, opisani v tem navodilu za uporabo, niso znani nobeni stranski učinki in kontraindikacije. Glede na trenutno strokovno znanje ni znanih dokazov, ki bi izključevali uporabo zdravila pri nosečnicah.

Pakiranje 35ml e s kanilo



EKUBERG
pharma s.r.l.

AHC-0020



Dispositivo medico CE con cannula endorettale
Dispositif médical CE avec canule endorectale
Medical device CE with endorectal cannula