

Uporaba / Upotreba

Novalac PLUS začetno mleko je primerno za dojenčke od rojstva do 6. meseca starosti, ko jih matere ne dojijo ali so le ti delno dojeni. Uporabljajte ga lahko vse dokler dojenčka hranite po steklenički. Ko Novalac PLUS začetno mleko več ne nasiti dojenčka, svetujemo, da preidete na Novalac 1 začetno mleko. Po dopolnjenem 6. mesecu starosti svetujemo prehod na Novalac 2 nadaljevalno mleko. Novalac PLUS je del obsežne linije proizvodov, razvitih posebej za zadovoljevanje prehranskih zahtev dojenčkov. / Novalac PLUS začetna mlečna hrana primjerena je za hranjenje dojenčadi od rođenja do 6. meseca starosti, ako majka ne doji ili ako djelomično doji. Možete ju koristiti sve dok dojenče hranite na bočicu. Ako Novalac PLUS početna mliječna hrana dovoljno ne zasićuje dojenče, savjetujemo da prijedete na Novalac 1 početnu mliječnu hranu. Nakon 6 mjeseci starosti preporučujemo prijelaz na Novalac 2, prijelaznu mliječnu hranu. Novalac PLUS dio je opsežne linije proizvoda posebno razvijenih za zadovoljavanje prehranbenih potreba dojenčadi.

Pomembno opozorilo / Važna napomena

Materino mleko je najboljša hrana za dojenčke. Mleko Novalac se uporablja samo po nasvetu strokovnjakov s področja medicine, prehrane, farmacije ali druge strokovne osebe, ki je odgovorna za skrb matere in otroka. Posebna pozornost pri uporabi Novalac mleka je potrebna pri dojenčkih z oslabiljenim imunskim odzivom, nedonošenčkih ali novorojenčkih z nizko porodno težo ter v primeru alergijskih reakcij na mlečne beljakovine. Nepravilna priprava ali shranjevanje lahko predstavlja tveganje za zdravje. Pri hranjenju po steklenički poskrbite, da stik med mlekom in zobmi vašega otroka ni predolg ali pogost, ker to povečuje možnost za nastanek kariesa. Vedno umijte zobe vašega otroka po zadnjem nočnem obroku. / Majčino mlijeko najbolja je hrana za dojenčad. Mliječna hrana za dojenčad koristi se samo prema preporukama stručnjaka s područja medicine, prehrane, farmacije ili druge stručne osobe odgovorne za zdravlje majke i djeteta. Poseban oprez kod upotrebe mliječne hrane Novalac potreban je kod dojenčadi s oslabljenim imunitetom, nedonoščadi ili novorođenčadi niske porođajne težine te kod alergijskih reakcija na mliječne bjelancevine. Nepravilna priprema ili čuvanje mogu predstavljati rizik po zdravlje. Pri hranjenju na bočicu pazite da kontakt između mliječne hrane i broj vašega djeteta ne bude predug ili prečest jer to povećava mogućnost nastanka karijesa. Uvijek operite zube djetetu nakon zadnjeg noćnog obroka.

Odmerjanje / Doziranje

Starost dojenčka (mesece) / Starost dojenčeta (mjeseci)	0-1	1-2	2-4	4-6
Število obrokov na dan / Broj obroka na dan	6	5	5	4
Število meric za pripravo enega obroka / Broj mjerica za pripremu jednog obroka	3	4	5	7
Količina vode (ml) / Količina vode (ml)	90	120	150	210

Do vrha napolnjena in do roba poravnana priložena merica vsebuje 4,3 g Novalaca PLUS. Eno merico raztopite v 30 ml vode. Dnevno količino hrane in število obrokov prilagodite dojenčkovi starosti in njegovim potrebam. Če zdravnik ne svetuje drugače, upoštevajte priporočila v tabeli. / Do vrha napunjena i do ruba poravnana priložena mjerica sadržava 4,3 g Novalaca PLUS. Jednu mjericu rastopite u 30 ml vode. Dnevno količinu hrane i broj obroka treba prilagoditi starosti i potrebama dojenčeta. Ako liječnik drugačije ne savjetuje, uvažite preporuke u tablici.

- Vedno pripravite svež obrok.
- Hranite na suhem mestu, zaščiten pred toploto in svetlobo.
- Izdelek je uporaben najmanj do datuma, odtisnjenega na dnu pločevinke.
- Po prvem odprtju pločevinke, morate vsebino porabiti v treh tednih.
- Po vsaki uporabi pločevinke dobro zaprite.
- Ne shranjujte nepoptitega obroka. Ostanek zavrzite. /
- Uvijek pripremite svjež obrok.
- Čuvajte na suhom mjestu, zaštićeno od svjetla i topline.
- Proizvod je najbolje upotrijebiti do datuma otisnutog na dnu limenke.
- Nakon prvog otvaranja limenke sadržaj upotrijebite u roku od 3 tjedna.
- Nakon svake upotrebe limenku dobro zatvorite.
- Ne čuvajte nepopijeni obrok. Ostatak bacite.

Pakirano v kontrolirani atmosferi. / Pakirano u kontroliranoj atmosferi.
Sedež podjetja: UP Medi-Europa SA, Švica - Distributer: Medis, d.o.o., Bmčičeva 1, Ljubljana
Sjedište poduzeća: UP Medi-Europa SA, Švicarska - Kontakt za Hrvatsku: Medis Adria d.o.o., Kolarova 7, Zagreb.



* Kot za hrana zakonodajja za vse začetne formule za dojenčke/kako je propisano zakonodajstvom za svu početnu hranu za dojenčad

Novalac PLUS

Začetno mleko za dojenčke
Početna mliječna hrana
za dojenčad

Vsebuje DHA*
Sadržava DHA*



0-6 mesecev/
mjeseci

400 g e

Hranilna vrednost / Hranjiva vrijednost

	100 g	100 ml
Energijska vrednost/Energetska vrijednost		
	kJ	2118
	kcal	506
Masčobe/Masti	g	26
- od tega nasičene masčobe/	g	12
- od kojih zasićene masne kiseline		
- linolna kislina/linolna kiselina	g	4,5
- alfa linolenska kislina/alfa linolenska kiselina	mg	405
- DHA (dokozahexaenojska kislina/dokozahexaenska kiselina)	mg	120
- ARA (arahidonska kislina/arahidonska kiselina)	mg	60
Objigjivni hidrati/Objigjihidrati	g	56,8
- od tega sladkorji / od kojih sečeri	g	56,8
GOS (Galaktooligosaharidi)	g	1,9
Prehranske vlaknine/Vlakna	g	1,3
Beljakovine/Bjelancevine	g	10,4
Vitamiini		
A	µg	440
D	µg	11,2
E	mg	8,7
K	µg	60
C	mg	60
Tiamin	mg	0,8
Riboflavin	mg	1,2
Niacin	mg	4,5
B6	mg	0,5
Folna kislina/Folna kiselina	µg	80
Folat	µg-DFE	150
B12	µg	1,5
Biotin	µg	18
Pantotenska kislina/Pantotenska kiselina	mg	5
Minerali		
Natrij	mg	165
Kalij	mg	525
Klorid	mg	400
Kalcij	mg	380
Fosfor	mg	240
Magnezij	mg	45
Železo/Željezo	mg	4
Cink	mg	3,3
Baker/Bakar	mg	0,38
Mangan	mg	0,045
Fluorid	mg	<0,45
Selen	µg	22
Jod	µg	95
Holin/Kolin	mg	170
Inozitol	mg	80
Taurin/Taurin	mg	40
L-karnitin	mg	20
Nukleotidi	mg	18,6

Sestavine / Sastojci

Posneto mleko, mlečne beljakovine, rastlinska olja (palmove, kokosovo, sojino, repično), laktoza, galaktooligosaharidi (mleko), ribje olje (DHA), emulgator (sojin lecitin), trikalcijev citrat, kalijev klorid, holin bitartrat, trikalcijev fosfat, kalijev klorid, trinatrijev citrat, olje iz gljive Mortierella alpina (ARA), L-tirozin, vitamini (retinilat, tiaminijev hidroklorid, riboflavin, cianokobalamin, riboflavin, piridoksinijev hidroklorid, natrijev-L-askorbat, holekalciferol, DL-alfa-tokoferilni acetat, fitomenadion, D-biotin, folna kislina, nikotinamid, kalcijev D-pantotenat), natrijev klorid, železov difosfat, taurin, trikalcijev citrat, kalijev klorid, kolin bitartrat, trikalcijev fosfat, kalijev klorid, trinatrijev citrat, olje gljive Mortierella alpina (ARA), L-tirozin, vitamini (retinil-acetat, tiamin-hidroklorid, cianokobalamin, riboflavin, piridoksin-hidroklorid, natrijev-L-askorbat, kolekalciferol, DL-alfa-tokoferilni acetat, fitomenadion, D-biotin, folna kislina, nikotinamid, kalcijev D-pantotenat), natrijev klorid, železov difosfat, taurin, trikalcijev citrat, kalijev klorid, inozitol, L-triptofan, magnezijev klorid, magnezijev oksid, nukleotidi (CMP, UMP, AMP, IMP, GMP), L-karnitin, cinkov sulfat, kalijev jodid, antioksidanti (ekstrakt bogat s tokoferoli, askorbil palmitat), natrijev selenit, bakrov sulfat, manganov sulfat. / Otvorano mlijeko, mliječne bjelancevine, biljna ulja (palmino, kokosovo, sojino, ulje uljana repice), laktoza, galaktooligosaharidi (mlijeko), riblje ulje (DHA), emulgator (sojin lecitin), trikalcijev citrat, kalijev klorid, kolin bitartrat, trikalcijev fosfat, kalijev klorid, trinatrijev citrat, ulje gljive Mortierella alpina (ARA), L-tirozin, vitamini (retinil-acetat, tiamin-hidroklorid, cianokobalamin, riboflavin, piridoksin-hidroklorid, natrijev-L-askorbat, kolekalciferol, DL-alfa-tokoferilni acetat, fitomenadion, D-biotin, folna kiselina, nikotinamid, kalcijev D-pantotenat), natrijev klorid, železov difosfat, taurin, trikalcijev citrat, kalijev klorid, inozitol, L-triptofan, magnezijev klorid, magnezijev oksid, nukleotidi (CMP, UMP, AMP, IMP, GMP), L-karnitin, cinkov sulfat, kalijev jodid, antioksidansi (ekstrakt bogat tokofereolima, askorbil palmitat), natrijev selenit, bakrov sulfat, manganov sulfat.

Navodila za pripravo / Uputa za pripremu

1. Stekleničko in pokrovček z dušo prekuhajte v vodi. Vre naj vsaj 5 minut. / Bočicu i poklopac sa dušom prokuhajte u vodi. Neka ključa bar 5 minuta.
2. Vodu za pripravo obroka zavrite v pokritem lončku. Vre naj vsaj 5 minut. / Vodu za pripremu obroka prokuhajte u pokrivnom lončiću. Neka ključa bar 5 minuta.
3. Vodu v lončku ohladite na 40 °C in jo prelijte v stekleničko. / Vodu u lončiću ohladite na 40°C i prelijte je u bočicu.
4. V stekleničko s priloženo merico vsujete predpisano število meric. / Uspite u bočicu propisani broj mjerica pomoću priložene mjerice.
5. Stekleničko zaprite in dobro pretresite, da se prašek popolnoma raztopi. / Bočicu zatvorite i dobro promućkajte da se prašak potpuno otopi.
6. Pripravljen obrok ohladite do mlačnega (37 °C), oz. dokler na koži ne čutite ne toplo ne hladno. / Pripremljeni obrok ohladite do mlakog (37°C), odnosno dok na koži ne osjetite ni hladno ni toplo.