

OROXID® sensitiv - oralni gel

1. Opis izdelka in namen uporabe

OROXID® sensitiv je gel, ki vsebuje 1,5 % vodikovega peroksida in se uporablja za vzdrževanje ustne higijene in zdravih dlesni ter kot pomoč pri vnetnih stanjih v ustni votlini.

Namenjen je preprečevanju in lajšanju boleznih obzobnih tkiv, kot so npr. razdražene, krvaveče in vnete dlesni. Pomaga pri lajšanju gingivitisa, parodontitisa, poškodb dlesni zaradi posegov, kot je na primer puljenje zob. Za preprečevanje gingivitisa in drugih vnetnih bolezni v ustni votlini je nujno potrebna ustrezna ustna higiena. Razvoj gingivitisa je pogojen s prisotnostjo zobnih oblog in bakterij.

OROXID® sensitiv zaradi svojih mehaničnih lastnosti in sproščanja kisika v obliki blagega penjenja pozitivno vpliva na mikrookolje poškodovane sluznice. Zato ga priporočamo kot dopolnitveno ustno higieno pri fiksni zobni aparaturi, delnih protezah, fiksni protetični nadomestki (prevleke, mostički) in zobnih vsadkih. Izboljšuje rezultate ustne higijene pri pacientih z ortodontskimi nepravilnostmi, ki otežujejo običajno zobno higieno. Vodikov peroksid lahko pomaga pri preprečevanju nastanka zobnih oblog/obarvanosti zob in zadaha. Pomaga tudi pri zmanjševanju oblog na jeziku in ustni sluznici, običajno pogojenih s prisotnostjo glivnih povzročiteljev ter odstranjuje zadah. Delovanje je izraženo le na površini, saj vodikov peroksid ne prehaja v globlja tkiva.

OROXID® sensitiv vsebuje kot pomožno snov Actipone® PX3 – izvleček zelišč. Izdelek je na voljo v obliki gela v pakiranjih po 15 ml, 30 ml in 50 ml.

2. Način uporabe

OROXID® sensitiv se uporablja dva- do trikrat na dan, najbolje po opravljenem čiščenju zob. Majhno količino gela **OROXID® sensitiv** (dva do trije pritiski na zaporko) nanesite na čist prst (ki ste ga temeljito umili z milom in vodo) ali na vatirano palčko ter ga nanesite na prizadet predel v ustni votlini. Pustite 30 sekund, da izdelek deluje. Po opravljenem tretmaju gel požvrkljajte z vodo in izpljunite.

Gel **OROXID® sensitiv** uporabljajte redno vse do izboljšanja stanja oziroma odstranitve vnetja. Če se stanje v obdobju 8 tednov ne izboljša, se posvetujte z zdravnikom. Izdelek **OROXID® sensitiv** ni namenjen za zdravljenje hujših vnetnih bolezni ustne votline, ki zajemajo tudi globlja tkiva; v tem primeru obiščite zdravnika. Za preventivne namene in vzdrževanje dobre higijene ustne votline uporabljajte izdelek **OROXID® sensitiv** enkrat na dan na način, kot je opisan zgoraj. Ob nanosu gela se lahko pojavi občutek penjenja, kar kaže na sproščanje aktivnega kisika.

3. Neželene učinke in previdnostni ukrepi

Pri uporabi na sluznici lahko vodikov peroksid v nizki koncentraciji redko povzroči občutek draženja. V primeru preobčutljivostne reakcije ali draženja izdelek **OROXID® sensitiv** prenehajte uporabljati. Občutek draženja je prehodne narave, ki po nekaj minutah ali po spiranju z vodo preneha. Izdelek **OROXID® sensitiv** je namenjen le za lokalno uporabo v ustni votlini. Izdelek ni namenjen uživanju in ga po opravljenem žvrkljanju izpljunite. Izogibajte se stiku z očmi.

Stik z očmi

Stik izdelka **OROXID® sensitiv** z očesom lahko povzroči draženje, solzenje in zamegljen vid, vendar so hujše poškodbe malo verjetne. Ob stiku gela z očmi je treba prizadeto oko izpirati s tekočo vodo ali fiziološko raztopino ter po potrebi obiskati zdravnika.

Zaužitje

Ob zaužitju lahko izdelek **OROXID® sensitiv** povzroči blago draženje sluznice prebavil, bruhanje in drisko. Ob zaužitju večje količine gela ter ob pojavu hujših simptomov se posvetujte z zdravnikom.

Vdihavanje

Izdelek **OROXID® sensitiv** pri sobni temperaturi ne tvori znatnih količin hlapov vodikovega peroksida. Pri segrevanju lahko pride do akutnega vdihavanja vodikovega peroksida, ki lahko povzroči draženje v nosu, žrelu in dihalih.

Razlitje

Vsebnika ne odpirajte, da se vsebina ne razlije. Razlito vsebino s predmetov pobrišite z dovoljšno količino papirja in si nato umijte roke.

4. Sestavine

Gel **OROXID® sensitiv** vsebuje deionizirano vodo, 1,5-odstotno raztopino vodikovega peroksida, Actipone® PX3 (Aqua, Glycerin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Zingiber Officinale Root Extract, Commiphora Myrrha Resin Extract, Echinacea Purpurea Extract), Aristoflex HMB, Sepinov EMT 10, arome in stabilizator.

5. Shranjevanje, rok uporabe

Gel **OROXID® sensitiv** hranite pri sobni temperaturi od 5 °C do 25 °C.

Rok uporabe izdelka je dve leti.

Izdelka ne uporabljajte po preteku roka uporabe.

Shranjujte zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo.

Uporabljajte le izdelek v nepoškodovanem vsebniku.

Shranjujte nedosegljivo otrokom.

Proizvajalec:



ENIKAM d.o.o.

Cesta Andreja Bitenca 118

1000 Ljubljana, Slovenija

info@enikam-oxy.com

Tel.: +386 31 634 900

www.oxid.si, www.enikam.si

Opis simbolov na ovojnini:



Številka serije



Uporabno do mesec/leto



Upoštevajte navodila za uporabo



Shranjevanje/temperatura



Zaščitite pred sončno svetlobo



Pozor



Proizvajalec

