

Aptamil® Pregomin ADC od rojstva naprej

SAMO ZA ENTERALNO UPORABO

V tabeli za hranjenje so splošna navodila za pripravo; vaš dojenček pa lahko potrebuje več ali manj od navedenega.

Starost dojenčka	Približna teža (kg)	Št. hranjenj na 24 ur	Za en obrok potrebujete	
			količina vode ml	število meric ADC
Od 0 – 14 dni	2,5–3	7	60	2
2 – 8 tednov	3–3,5	6	90	3
2 meseca	3,5–4	5	120	4
3 mesece	4–5	5	150	5
4 mesece	5–6	5	180	6
5 mesecev	6–7	5	210	7
Po 6. mesecu	>7	4	210	7

Štandardna raztopina:

100 ml obroka = 90 ml vode (zaželeno 40° C) + 3 merice Aptamil ADC = 276 kJ (66 kcal).

Do vrha napolnjena in z nožem do roba poravnana priložena merica vsebuje približno 4,5 g. Uporabljajte le priloženo merico. Formule ne pripravljajte močnejše ali šibkeje koncentracije kot je navedeno.

Uporaba in nasveti za shranjevanje

- ✓ Iz higienskih razlogov pripravite vedno le svež obrok in ga takoj uporabite (v 1 uri, nato zavrzite).
- ✓ Ne pogrevajte obroka v mikrovalovni pečici zaradi možnosti pregretja.
- ✓ Izdelek hranite v suhem in hladnem prostoru (ne v hladilniku).
- ✓ Porabite v 3 tednih po odprtju.

Pakirano v kontrolirani atmosferi.

Originalno zaprt izdelek je uporaben najmanj do:

datum in kontrolna številka sta odtisnjeni na dnu pločevinke.

Proizvajala: Nutricia Cuijk B.V., Schuttersweg 12, 5443 PR Haps, Nizozemska

Distribuirala: Merit HP d.o.o., Beogradska ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija

Svetovalna linija: 080 15 36, e-mail: info@merit-hp.si, www.aptaclub.si

Aptamil Pregomin ADC

Za prehransko uravnavanje alergije na beljakovine kravjega mleka ali/in malabsorpcije maščob od rojstva naprej
Živilo za posebne zdravstvene namene

- ✓ hipoalergena formula
- ✓ ekstenzivno hidrolizirane beljakovine sirotke
- ✓ srednjeveržni trigliceridi (MCT) in zmanjšana količina laktoze*

Naše strokovno znanje je edinstveno

S 120-imi leti tradicije je Nutricia največji strokovnjak na področju prehrane v zgodnjem obdobju. Že več kot 40 let je naša skupina znanstvenikov in strokovnjakov (več kot 500) pionir v raziskavi otroške hrane.

Te raziskave so nam omogočile razvoj našega Aptamil Pregomin Allergy Digestive Care (ADC), posebej pripravljene za dojenčke z diagnosticirano alergijo na beljakovine kravjega mleka ali/in malabsorpcijo maščob.

Aptamil® Pregomin ADC: živilo za posebne zdravstvene namene



Naša patentirana mešanica sestavin:

- ✓ ekstenzivno hidrolizirane beljakovine sirotke
- ✓ srednjeveržni trigliceridi (MCT)
- ✓ zmanjšana količina laktoze*

*v primerjavi z začetnim mlekom za dojenčke

Sestavine: glukozni sirup, hidrolizirane beljakovine sirotke (iz mleka), srednjeveržni trigliceridi (kokosovo in/ali palmovo olje), rastlinska olja (repično, sončnično, palmovo olje in olje iz Mortierella Alpina, ekstra sončnično olje), maltodekstrin, kalcijev fosfat, kalcijev citrat, emulgator: estri citronske kisline mono- in digliceridov, ribje olje, kalcijev klorid, kalcijev dihidrogen fosfat, hlin klorid, magnezijev hidrogen fosfat, L-askorbinska kislina, inositol, taurin, natrijev klorid, kalcijev klorid, L-karnitin, železov sulfat, cinkov sulfat, DL-alfa tokoferil acetat, uridin 5'-monofosfat natrijeva sol, citidin 5'-monofosfat, askorbil palmitat, kalcijev D-pantotenat, adenozin 5'-monofosfat, inozin 5'-monofosfat natrijeva sol, nikotinamid, DL-alfa tokoferol, gvanozin 5'-monofosfat natrijeva sol, bakrov sulfat, riboflavin, retinil palmitat, tiamin hidroklorid, piridoksin hidroklorid, kalcijev jodid, pteroilmonoglutaminska kislina, natrijev selenit, manganov sulfat, fitomenadion, D-biotin, holekalciferol, cianokobalamin. **Alergeni:** mleko in ribe.



MODRA ŠTEVILKA

080 15 36

Neto: 400g e

Hranilna vrednost	EM	Na 100 ml obroka ¹	Na 100 g mlečnega prahu
Energijska vrednost	kJ/kcal	276/66	2063/493
Maščobe	g	3,4	25
-nasičene maščobne kisline	g	2,1	16
-enkrat nenasičene maščobne kisline	g	0,7	5,1
-večkrat nenasičene maščobne kisline	g	0,6	4,2
-linolna kislina (LA)	mg	439	3300
- α -linolenska kislina (ALA)	mg	54	400
-arahidonska kislina (AA)	mg	17	120
-dokozaheksaenojska kislina (DHA)	mg	17	120
Srednjeveržni trigliceridi (MCT)	g	1,7	12
Ogljikovi hidrati in od teh	g	7,2	54
Sladkorji	g	1,1	8,1
-laktaza	g	0,05	0,39
Poliohi			
-inozitol	mg	7,3	54
Prehranske vlaknine	g	0	0
Beljakovine²	g	1,8	13
Beljakovine sirotke	g	1,8	13
Sol	g	0,05	0,41
Vitamini			
Vitamin A	μ g	59	443
Vitamin D	μ g	1,7	13
Vitamin E	mgTE	1,2	8,8
Vitamin K	μ g	4,4	33
Vitamin C	mg	9,3	70

Hranilna vrednost	EM	Na 100 ml obroka ¹	Na 100 g mlečnega prahu
Tiamin (B1)	mg	0,07	0,50
Riboflavin (B2)	mg	0,14	1,1
Niacin (B3)	mg	0,43	3,2
Vitamin B6	mg	0,05	0,35
Folat	μ g	14	104
Vitamin B12	μ g	0,16	1,2
Biotin	μ g	1,7	13
Pantotenska kislina	mg	0,54	4,0
Minerali			
Natrij	mg	22	162
Kalij	mg	75	557
Klorid	mg	43	322
Kalcij	mg	76	570
Fosfor	mg	47	349
Magnezij	mg	5,1	38
Železo	mg	0,72	5,4
Cink	mg	0,67	5,0
Baker	mg	0,05	0,39
Mangan	mg	0,003	0,02
Fluorid	μ g	$\leq 0,006$	$\leq 0,04$
Molibden	μ g	$\leq 5,9$	≤ 44
Selen	μ g	2,9	22
Krom	μ g	$\leq 5,9$	≤ 44
Jod	μ g	13	95
Ostalo			
L-karnitin	mg	2,1	16
Holin	mg	19	140
Tavrin	mg	5,4	40
Nukleotidi	mg	2,3	17

¹100 ml obroka = 90 ml vode (zaželeno 40° C)+ 3 merice (13,5 g)

²ekstenzivno hidrolizirane beljakovine kravjega mleka

Priprava

- 1 Vedno si umijte roke in vse pripomočke, ki jih boste uporabili.
- 2 Stekleničko in ceuelj sterilizirajte v vreli vodi 10 minut.
- 3 Zavrite pitno vodo za 10 minut in jo ohladite na približno 40 °C. V stekleničko vlijete potrebno količino prekuhane vode.
- 4 Merico napolnite z izdelkom in jo poravnajte z nožem do roba (ne pritiskajte). V stekleničko z vodo dodajte ustrezno število meric izdelka.
- 5 Stekleničko zaprite z zamaškom in jo stresajte. Namestite steriliziran ceuelj. Temperaturo obroka preverite na svojem zapestju. Idealna temperatura obroka je, ko ne čutite ne toplo ne hladno (cca 37 °C). Pripravite vedno le svež obrok in ga takoj uporabite.
- 6 Stekleničko in ceuelj očistite takoj po uporabi. Ostanke hrane ne uporabljajte ponovno. Dobro zaprt izdelek hranite v suhem in hladnem prostoru (ne v hladilniku). Porabite v 3 tednih po odprtju.

POMEMBNO OBVESTILO

Materino mleko je najboljša hrana za dojenčka. Če mati ne more dojiti ali ima premalo mleka, naj se o uporabi nadomestne hrane in načinu hranjenja posvetuje z zdravnikom pediatrom, oziroma drugim strokovnim osebjem s področja medicine, farmacije oz. prehrane, nege in otroka.

Izdelek se mora uporabljati pod zdravniškim nadzorom.

Aptamil Pregomin ADC je namenjen za posebne zdravstvene namene in se lahko uporablja kot edini vir prehrane dojenčkov od rojstva do 6. meseca starosti. Če dojenčka dojite in mu ponudite hrano po steklenički, se lahko zgodi, da ne bo želel nadaljevati z dojenjem. Natančno upoštevajte navodila za pripravo obroka. Nepravilna priprava obroka predstavlja tveganje za zdravje vašega otroka. Med hranjenjem dojenčka nikoli ne pustite samega.

Po dopolnjenem 6. mesecu starosti po nasvetu zdravnika ali medicinske sestre postopoma pričnite z uvajanjem čvrste hrane.